



Dr. Sébastien Geering

Spécialiste FMH en Chirurgie

Orale et Maxillo- Faciale



Chaussée de la Boine 2
2000 Neuchâtel



032. 724. 91. 91



info@cabinetmaxillogeering.ch



Recommandations post-intervention : pose d'implant dentaire

Afin de favoriser une cicatrisation optimale et de limiter les complications, merci de suivre ces consignes.

Suites post-intervention

- L'anesthésie peut durer 2 à 4 heures. Pendant ce temps, ne pas manger ni boire.
- Jusqu'au retour de la sensibilité, éviter de mordre ou de toucher la zone.
- Éviter de manipuler la zone de l'implant avec la langue ou les doigts.
- Les fils de suture ne sont pas résorbables et seront retirés lors du contrôle au cabinet. Ils peuvent parfois être légèrement gênants.

Alimentation

- Jour de l'intervention : privilégier des aliments froids et mous.
- Pendant 48 à 72 heures : consommer des aliments tièdes, mous et faciles à mâcher, en évitant toute mastication du côté de l'implant.

Douleur et gonflement

- Prendre les médicaments prescrits selon les indications données.
- Appliquer de la glace sur la joue le jour de l'intervention et le lendemain.
- Un léger gonflement est normal et peut augmenter pendant 48 à 72 heures.

Saignement

- Un léger saignement est normal durant les premières heures.
- En cas de saignement important et persistant, contacter le cabinet.

Hygiène bucco-dentaire

- Brosser les dents délicatement en évitant la zone de l'implant.
- Recracher simplement le dentifrice sans rinçage vigoureux.
- Commencer les bains de bouche selon prescription, sans gargarisme (mouvements latéraux de la tête uniquement).

Complications possibles

- En cas de douleur intense, saignement important, fièvre ou mauvaise odeur persistante, contacter le cabinet.
- En cas de dévissage du capuchon de cicatrisation, contacter le cabinet sans tenter de le revisser.

À éviter pendant la cicatrisation

-  Ne pas fumer.
-  Éviter les aliments croquants, durs ou épicés jusqu'au contrôle.
-  Limiter les efforts physiques importants pendant 7 jours.
-  Ne pas manipuler la zone opérée.